

8/3/3020

## נייד עמדה של האיגוד הישראלי לרומטולוגיה בנושא נגיף הקורונה

### **הנחיות משרד הבריאות**

בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה ( COVID 19 ) כאירוע חרום בבריאות הציבור. הנגיף מועבר מאדם לאדם, ככל הנראה בעיקר במגע והעברה טיפית (שיעול והתעטשות). המחלה יכולה להיות ללא תסמינים או עם תסמינים קלים בלבד.

### חשד לזיהום בנגיף קיים כאשר:

#### **מתקיים אחד מהבאים:**

1. אם ב- 14 יום לפני תחילת תסמינים הייתה שהייה באחת מהמדינות הבאות: סין, הונג קונג, מקאו, סינגפור, תאילנד, טאיוון, יפן, דרום קוריאה, איטליה, גרמניה, ספרד, צרפת, שווייץ, ספרד, אוסטרליה. חניית ביניים אינה נחשבת שהייה, למעט בסין היבשתית, דרום קוריאה, איטליה.
2. היה מגע הדוק עם חולה COVID-19 מוכח.

#### **"מגע הדוק" מוגדר כ:**

- שהייה במרחק של עד 2 מטר, במשך 15 דקות לפחות עם חולה COVID-19 מוכח.
- עבודה צמודה או שהייה באותו מתחם של חולה COVID-19.
- נסיעה יחד עם חולה COVID-19 בכל אמצעי תחבורה (בקרבה של עד שני מושבים).
- בני בית של חולה COVID-19

### **פרופ' מחמוד אבו-שקרה**

יו"ר וועד האיגוד

### **חברי וועד האיגוד:**

פרופ' מרב לידר - גזברית

פרופ' דפנה פארן - מזכירה

ד"ר דורון רימר - מנהל אתר

פרופ' יעקב אבלין | פרופ' אורי אלקיים | פרופ' ליאורה הראל | ד"ר יולנדה בראון

## ובנוסף קיים אחד מהבאים:

חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר.

- א. כאשר תנאים אלו מתקיימים ויש חשד לזיהום בנגיף יש לפנות לאחד מחדרי המיון הערוכים לכך.
- ב. כאשר אין תסמינים של חום / שיעול / קושי בנשימה יש להיכנס לבידוד למשך 14 יום ממועד החשיפה.

## המלצות האיגוד הישראלי לרומטולוגיה

1. יש להקטין ככל האפשר סכנת חשיפה לנגיף תוך הימנעות משהייה במרחבים ציבוריים ולהימנע מנסיעות לחו"ל
  2. יש לשמור מרחק של יותר ממטר מכל אדם חולה, מתעטש או משתעל.
  3. יש להקפיד על שטיפת ידיים במים וסבון ומגבונים על בסיס אלקוהול.
  4. יש להימנע ממגע הידיים בעיניים, בפה או באף
  5. בכל מצב בו יש חום גבוה, וחשד למחלה זיהומית:  
יש להפסיק טיפול ביולוגי עד חלוף החום והבראה מהמחלה הזיהומית
- מטופלים בטיפול ביולוגי אשר שוהים בבידוד אך אינם סובלים מתסמינים של שיעול, קוצר נשימה או חום אינם צריכים להפסיק טיפול ביולוגי.
  - מטופלים ראומטולוגים שאינם סובלים מתסמינים של שיעול, קוצר נשימה או חום אינם צריכים להפסיק טיפול ביולוגי.
  - במטופלים המתוכננים לקבל טיפול במבטרה שהינה בעלת השפעה ארוכת טווח יש לשקול כל מקרה לגופו יחד עם הראומטולוג המטפל. במידה ומדובר בטיפול אחזקה בלבד יש לשקול דחיית הטיפול

## פרופ' מחמוד אבו-שקרה

יו"ר וועד האיגוד

במבטרה תוך תיאום עם הראומטולוג המטפל.

- יש להתייעץ עם הרופא המטפל בכל מקרה לא ברור

## חברי וועד האיגוד:

פרופ' מרב לידר - גזברית

פרופ' דפנה פארן - מזכירה

ד"ר דורון רימר - מנהל אתר

פרופ' יעקב אבלין | פרופ' אורי אלקיים | פרופ' ליאורה הראל | ד"ר יולנדה בראון